

MISSION J. DE ROHAN-CHABOT  
DANS L'ANGOLA ET DANS LA RHODÉSIA (1914).

DESCRIPTION DE CURCULIONIDES NOUVEAUX,

PAR M. A. HUSTACHE.

(1<sup>re</sup> Note.)

**Tanymecus benguelensis** nov. sp.

Brun, noir, revêtu d'une courte pubescence squamuleuse cendrée à peine soulevée, les squamules linéaires raides, les côtés du prothorax ornés d'une bande brune prolongée sur les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> interstries des élytres.

Tête et rostre à ponctuation serrée, confluyente en petites rides longitudinales, le front entre les yeux aussi large que la base du rostre et légèrement relevé en une carène large, obtuse et squamulée, la pubescence brune, cendrée autour des yeux, ces derniers brièvement ovales et peu convexes. Rostre un peu plus court que la tête, graduellement mais faiblement rétréci en avant, les scrobes presque en entier visibles de haut, le sommet triangulairement échancré. Antennes ferrugineuses grêles, le scape atteignant le bord postérieur de l'œil, le 1<sup>er</sup> article du funicule un peu plus long que le 2<sup>e</sup>; le 2<sup>e</sup> un peu plus court que les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> réunis.

Prothorax un peu plus (♂) ou un peu moins (♀) long que large, sa plus grande largeur en avant du milieu, les côtés faiblement arqués, la base un peu plus étroite que le bord antérieur, le disque moyennement convexe et à ponctuation serrée. Écusson indistinct.

Élytres légèrement échancrés en arc à la base, séparément arrondis sub-acuminés au sommet, les calus huméraux et antéapicaux effacés, les stries fines et profondément ponctuées, les intestries plans et finement chagrinés.

Pattes densément couvertes de squamules cendrées et brunes, fémurs antérieurs plus épais que les autres, les quatre antérieurs chez le ♂ munis en dessous d'une frange de fine pubescence blanche; tarses ferrugineux, le 1<sup>er</sup> article plus court que les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> réunis.

Long., 6-7 millimètres.

Angola : Benguela, Capelongo Dongo, décembre 1914.

Deux mâles et trois femelles.

Cette espèce est certainement très voisine de *T. destructor* Marsh. du Sud de la Rhodésie; elle s'en distingue principalement par la forme différente du prothorax et des élytres.

GENRE **Siderodactylus** Schoenherr.

**Siderodactylus latirostris** nov. sp.

Revêtu en dessus de squamules très serrées d'un beau vert clair un peu brillantes, entremêlées sur le rostre, la tête et la déclivité postérieure des élytres de soies blanches excessivement courtes, visibles seulement de profil et sous un fort grossissement.

Rostre carré, à peu près aussi large que la tête, largement et profondément déprimé, muni au milieu d'une ligne enfoncée prolongée jusque sur le vertex, et de chaque côté de deux sillons peu profonds, l'un en dessus, contre le bord latéral, l'autre latéral, devant l'œil; pourvu de quatre carènes, les deux internes assez vives. Tête plus du double aussi large que longue; yeux médiocres, légèrement ovales, un peu saillants, entourés d'un cercle de squamules d'un vert argenté. Antennes assez grêles, ferrugineuses, la massue rembrunie, insérées un peu en avant du milieu du rostre; scape mince à la base, brusquement et fortement épaissi au sommet; 1<sup>er</sup> article du funicule allongé, presque aussi long que les 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> ensemble, le 2<sup>e</sup> une fois et demie aussi long que le 3<sup>e</sup>, ce dernier conique et plus long que large, les suivants plus épais, noueux et plus longs que larges, le 7<sup>e</sup> conique et plus long que le 6<sup>e</sup>, la massue oblongue fusiforme.

Prothorax transversal, fortement étranglé derrière le bord antérieur qui est relevé, la base finement rebordée, médiocrement convexe, muni en son milieu d'une ligne enfoncée, effacée en avant. Écusson petit, rond, squamulé.

Élytres rebordés à la base, isolément et brièvement acuminés au sommet, les stries fines, leurs points arrondis, les interstries plans, légèrement convexes vers le sommet.

Pattes squamulées; fémurs antérieurs très fortement renflés, leur tranche inférieure munie d'une ligne de pubescence blanche, dentée et échancrée près du genou, les autres fémurs normaux et inermes; tibias antérieurs fortement arqués en dedans, leur tranche interne finement ciliée, munie vis-à-vis de la dent fémorale d'une dent obtuse et grosse et denticulée de là au sommet, les denticules graduellement plus fins à partir de la base; tibias intermédiaires et postérieurs légèrement arqués en dehors, les postérieurs ciliés et assez fortement denticulés vers le sommet de leur tranche interne. Tarses longs.

Dessous et pattes à revêtement squamuleux d'un vert cendré, entremêlé de quelques squamules dorées.

Long., 5,5 millimètres.

Angola : District de Huïlla, de Cutchy au Cueleï; janvier-février 1914, un spécimen.

**Siderodactylus lineolatus** nov. sp.

Allongé, d'un brun noir, les antennes, le sommet des tibias et les tarsi roux, revêtu en dessus de squamules d'un vert clair, serrées, le prothorax orné de trois larges bandes foncées, les élytres avec une large bande foncée sur les interstries 6-8 et parfois avec la suture rembrunie.

Rostre court, plus court que le prothorax, large, rétréci en avant, longitudinalement déprimé, la dépression pourvue en son milieu d'une ligne enfoncée prolongée en arrière jusqu'au vertex, densément squamulé ainsi que la tête. Yeux grands et presque plans. Antennes assez grêles; scape légèrement arqué, peu claviforme, atteignant le tiers antérieur de l'œil; 1<sup>er</sup> article du funicule subconique, plus gros et presque aussi long que les 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup> réunis, le 3<sup>o</sup> conique et visiblement plus long que large, les suivants plus courts, subglobuleux, la massue oblongue acuminée, rembrunie.

Prothorax un peu plus large que les élytres, convexe, à ponctuation fine, serrée, peu visible, cachée par les squamules qui remplissent les points, muni en son milieu d'une ligne enfoncée, abrégée en avant. Écusson petit, squamulé.

Élytres légèrement rebordés à la base, isolément et brièvement acuminés au sommet, les stries fines et ponctuées, les interstries plans.

Pattes squamulées, les fémurs inermes; tibias râpeux, squamulés et pubescents, les postérieurs légèrement arqués en dehors, les antérieurs droits et munis de 6 à 8 forts denticules sur leur tranche interne; tarsi à pubescence jaune, dense en-dessus et en-dessous, les deux premiers articles très allongés, le 3<sup>o</sup> court, large, profondément bilobé.

Dessous uniformément revêtu de petites squamules d'un cendré verdâtre, entremêlées de poils blancs très courts, et de nombreux petits points noirs, dénudés.

Long., 6,5-7 millimètres.

Angola : Benguella, Capelongo, près Lucèque, décembre 1914, type; district de Huïlla, de Cutchy au Cueleï, janvier-février 1914, un exemplaire.

GENRE **Piazomias** Schoenherr.

**Piazomias brevis** nov. sp.

Brièvement ovale, brun de poix, mat, les antennes et les tarsi ferrugineuses, revêtu en dessus de squamules concaves, d'un jaune grisâtre et

cendrées, les premières formant une large bande sur les côtés du prothorax et quelques traits sur les côtés des élytres, le bord latéral de ces derniers et tout le dessous couvert de squamules serrées cendrées; muni en outre de soies très courtes noires, à peine soulevées et peu visibles sur la partie antérieure des élytres et le prothorax, hérissées et un peu plus longues sur la tête, beaucoup plus longues, blanches, bien visibles sur la déclivité postérieure des élytres.

Rostre plus court et un peu moins large que la tête, du double aussi large que long, plan en-dessus. Tête presque aussi longue que large, légèrement déprimée transversalement derrière les yeux, ainsi que le rostre, squamulée et pourvue de soies dressées autour des yeux; yeux grands, légèrement ovales, semi-globuleux. Antennes courtes; scape arqué, clavi-forme; 1<sup>er</sup> article du funicule plus long que le 2<sup>e</sup>, les suivants courts et serrés, graduellement plus épais, la massue noire, oblongue fusiforme et presque aussi longue que le reste du funicule.

Prothorax plus long que large à la base, arrondi sur les côtés, tronqué à ses extrémités, les lobes oculaires nuls, les vibrisses réduites à quelques cils assez courts; densément squamulé, les squamules de la bande latérale fortement concaves et en partie imbriquées. Écusson indistinct.

Élytres ovales, convexes, la déclivité postérieure arquée, les stries fines, les interstries larges, subplans, le 6<sup>e</sup> orné en son milieu d'une linéole cendrée.

Pattes assez grêles, finement squamulées de cendré; fémurs inermes; tibias droits, ongles connés.

Long. 3,7 millimètres.

Angola : Benguela, Capelongo-Dongo, décembre 1914, un spécimen.

#### PHYLLOBIINI.

Genre *Mylocerus* Schoenherr.

*Mylocerus angolanus* nov. sp.

Brun, les pattes testacées, les antennes ferrugineuses, revêtu de petites squamules rondes, serrées, cendrées et brunes, ces dernières formant une large bande médiane sur le prothorax et quelques taches irrégulières le long des stries internes des élytres.

Tête transversale, aussi large que le bord antérieur du prothorax, le front légèrement déprimé, les yeux grands, brièvement ovales, assez fortement saillants, les tempes plus courtes que le diamètre d'un œil, revêtue (ainsi que le rostre) de squamules laissant entre elles de nombreux petits points dénudés. Rostre aussi large que la tête, transversal, ses bords paral-

lèles, largement et profondément impressionné au milieu, l'impression limitée de chaque côté par une carène obtuse fortement sinuée, le sommet avec une large échancrure triangulaire ciliée, prolongée en arrière jusqu'au niveau du bord postérieur des ptérygies, les scrobes profonds, grands, fovéiformes en avant, brusquement coudés et effacés en arrière en avant des yeux. Antennes longues, finement squamulées et pubescentes; scape fortement arqué; légèrement épaissi au sommet; tous les articles du funicule coniques et beaucoup plus longs que larges, le 1<sup>er</sup> plus long que le 2<sup>e</sup>, le 5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup> légèrement épaissis, le 7<sup>e</sup> aussi long que le 2<sup>e</sup>, la massue oblongue fusiforme.

Prothorax aussi long que large à la base, la base bisinuée et un peu plus étroite que le bord antérieur, ce dernier légèrement relevé, les côtés légèrement arqués dans le milieu; transversalement impressionné largement et assez profondément en avant, brièvement et faiblement devant la base; le revêtement formé de squamules serrées, laissant apercevoir de nombreux points dénudés, les squamules de la bande médiane beaucoup plus petites. Écusson petit, arrondi, convexe, ponctué.

Élytres parallèles, largement arrondis au sommet; convexes, brusquement déclives en arrière, le calus huméral peu saillant, l'antéapical effacé; stries fines, ponctuées, les points serrés, pourvus au fond d'un poil excessivement court; interstries subplans, densément squamulés, munis chacun d'un rang de points d'où émergent des soies fines, noires, mi-dressées, excessivement courtes, peu visibles.

Pattes éparsément et finement squamulées; fémurs renflés, armés d'une très petite dent; dessous peu densément revêtu de squamules cendrées et plus petites que celles du dessus.

Long. 2,7 millimètres.

Angola : Benguela, de Dongo au Cubango, 1914, un exemplaire, type; district de Huilla, de Cutchy au Cueléi, janvier-février 1914, un exemplaire.

L'exemplaire de Huilla a le revêtement unicolore, cendré, les soies élytrales squamuleuses et blanches, les antennes un peu plus courtes.

#### GENRE *Amphorygma* Marshall.

#### *Amphorygma africana* nov. sp.

Brun, les pattes et les antennes ferrugineuses, le revêtement squamuleux brun et cendré.

Rostre transversal, plus étroit que la tête, ses bords latéraux parallèles et cendrés, largement impressionné en dessus entre l'insertion des antennes, sillonné ainsi que la tête sur sa ligne médiane, ses scrobes courts, arqués

dirigés en dessus. Tête rectangulaire, courte, large, les yeux grands, ronds, presque plans, bordés de squamules cendrées. Antennes assez robustes; scape fortement arqué, faiblement épaissi au sommet; deux premiers articles du funicule coniques, le 1<sup>er</sup> plus long que le 2<sup>e</sup> et du double aussi long que large, les 3<sup>e</sup> et 4<sup>e</sup> oblongs, plus longs que larges, les 5<sup>e</sup>, 6<sup>e</sup>, 7<sup>e</sup>, coniques, sensiblement plus épais et aussi plus longs que larges, la massue ovale acuminée, peu plus longue que les deux articles précédents réunis.

Prothorax très peu plus court que large à la base, les côtés très peu arqués, légèrement étranglé derrière le bord antérieur; modérément convexe, à ponctuation fine, serrée, voilée par le revêtement qui est brun en dessus, cendré sur les côtés et en dessous. Écusson semi-elliptique, cendré.

Elytres plus larges que le prothorax, les côtés légèrement sinués derrière les épaules, ces dernières assez saillantes, les stries fines et ponctuées, les interstries légèrement convexes, pourvus sur la brusque déclivité postérieure d'un rang de soies excessivement courtes, le revêtement très dense, d'un brun assez clair le long de la suture, plus foncé sur les côtés, la marge latérale cendrée sur les deux derniers interstries; on distingue encore çà et là, particulièrement dans la région scutellaire, quelques vagues petites taches cendrées.

Pattes assez robustes, finement squamulées de cendré et à pubescence très courte et éparse; fémurs armés près de leur milieu d'une petite épine noire; tibias assez épais, légèrement sinués sur leur tranche interne; tarses courts, le 2<sup>e</sup> article transversal, le 3<sup>e</sup> large et bilobé, les ongles petits et connés.

Dessous densément revêtu de squamules cendrées.

Long., 2,5 millimètres.

Angola : district de Huïlla, de Cutchy au Cueleï, janvier-février 1914, un exemplaire type; Benguela, de Dongo au Cubango, 1914, un exemplaire.

C'est la première espèce de ce genre indien signalée de l'Afrique.

#### HIPPORHINI.

GENRE *Hipporhinus* Schoenherr.

HIPPORHINUS ANGOLENSIS Marshall, *Proc. zool. Soc. London*,  
1904, p. 87, pl. III, fig. 4.

Angola : Benguela, de Cubango au Cutchy, janvier 1914.

Un exemplaire qui présente une légère différence avec la forme type, et qui a été vérifié par M. G. A. K. Marshall.

**ERIRRHINI.**

GENRE **Echinocnemus** Schöenh.

**Echinocnemus angolensis** nov. sp.

Brun, les antennes et les tarsi ferrugineux, le revêtement squamuleux dense, brun, plus clair, grisâtre sur les côtés et sur la ligne médiane du prothorax, les élytres ornés d'une linéole claire sur le 3<sup>e</sup> interstrie, en arrière du milieu, les soies du dessus claires et excessivement courtes, arquées à leur sommet.

Rostre à peine aussi long que le prothorax, épais, convexe en dessus, densément squamulé. Tête convexe, les yeux peu convexes et entourés d'un cercle de squamules claires. Antennes courtes, le 1<sup>er</sup> article du funicule subconique plus gros et beaucoup plus long que le 2<sup>e</sup>, ce dernier subconique, les suivants très serrés et graduellement épaissis, la massue ovale.

Prothorax à peu près aussi long que large à la base, les côtés très peu arqués et divergents en avant de la base au tiers antérieur, puis arrondis convergents en avant, la base arquée et à peine plus large que le bord antérieur, le disque avec deux larges bandes foncées, le milieu et les côtés plus clairs. Écusson rond, cendré.

Élytres plus larges et plus de trois fois aussi longs que le prothorax, légèrement impressionnés sous le calus antéapical, les stries fines, ponctuées, les interstries larges, peu convexes en avant, plus fortement vers le sommet.

Pattes densément couvertes de squamules grises entremêlées de quelques soies squamuleuses blanches; tibias fortement denticulés et à longue pubescence sur leur tranche interne. Dessous à revêtement dense, gris cendré, entremêlé de soies squamuleuses blanches.

Long., 4,5 millimètres.

Angola : Benguela, de Dongo au Cubango, 1914, un exemplaire.

Ce genre est représenté au Congo par plusieurs espèces différentes de celle-ci; elle diffère de *Echinoenenus bisignatus* par le rostre plus gros et plus court, les élytres plus longs.